

Pesche del germoplasma siciliano a polpa bianca



Agostina Currao






Agostina Currao


Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *precoce*

epoca di maturazione: *+ 12*

produttività: *media*





Caratt. qualitative

pH: **3,6**

acid. tit.(g/l): **1,05**

°Brix: **17,1**

rapporto E/A: **16,3**

sovraccalore: **38 %**

aroma: **lieve**

sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **piccolo**

larghezza cm.: **5,1**

spessore cm.: **5,1**

altezza cm.: **4,9**

apice: **incavato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **rotonda**

forma trasvers.: **rotonda**

colore polpa: **bianca**

aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **medio**

altezza cm.: **2,9**

larghezza cm.: **2,2**

spessore cm.: **1,8**

colore: **marrone**

forma: **ellittica**

superficie: **con cavità e scanalature**


angolo apicale: **medio**

simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 33,5
 lunghezza mm: 125
 larghezza mm: 39
 rapp. lung./larg.: 3.2
 posiz. Largh. Max.: *centrale*
 aspetto: *ondulato*
 ampiezza angolo apicale: *ampio*
 ampiezza angolo basale: *stretto*
 margine: *crenato*
 glandole: *globose*



Ramo

lunghezza internodi: *media*
 colorazione: *prevalentemente rossa*
 distrib. gemme a fiore: *tratto mediano*



Fiore

tipo: *rosaceo*
 grandezza: *media*
 forma petali: *rotondi*
 colore petali: *rosa pallido*
 area petali mm²: 231
 altezza pistillo: *uguali ad antere*





Aso 20






Aso 20


Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *media*

epoca di maturazione: *+ 84*

produttività: *alta*





Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Caratteristiche qualitative

Ph: **3,4**
 acid. tit.(g/l): **1,6**
 °Brix: **19,1**
 rapporto E/A: **11,9**
 sovraccolore: **12%**
 aroma: **intenso**
 sapore: **scarso**

Frutto

grandezza: **piccolo**
 larghezza cm.: **5,1**
 spessore cm.: **5,1**
 altezza cm.: **5,5**
 apice: **sporgente**
 umbone: **assente**
 forma longitud.: **oblunga**
 forma trasvers.: **triangolare solcata**
 colore polpa: **bianca**
 aderenza nocciolo: **aderente**




Nocciolo

dimensione: **grande**
 altezza cm.: **4**
 larghezza cm.: **2,6**
 spessore cm.: **2**
 colore: **marrone**
 forma: **ellittica**
 superficie: **con cavità e scanalature**
 angolo apicale: **stretto**
 simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 34
 lunghezza mm: 127
 larghezza mm: 39
 rapp. lung./larg.: 3.2
 posiz. Largh. Max.: *centrale*
 aspetto: *increspato lungo la nerv. centr.*
 ampiezza angolo apicale: *medio*
 ampiezza angolo basale: *medio*
 margine: *crenato*
 glandole: *assenti*

**Ramo**

lunghezza internodi: *corti*
 colorazione: *prevalentemente rossa*
 distrib. gemme a fiore: *tratto mediano*

**Fiore**

tipo: *campanulaceo*
 grandezza: *medio*
 forma petali: *ellittico-allungata*
 colore petali: *rosa*
 area petali mm²: 35
 altezza pistillo: *uguali ad antere*





Bambina






Bambina

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *media*

epoca di maturazione: *+ 11*

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Bambina in rapporto alle cultivar in catalogo



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Caratteristiche qualitative

Ph: **3,5**

acid. tit.(g/l): **1,1**

°Brix: **14,4**

rapporto E/A: **13,2**

sovraccolore: **78%**

aroma: **assente**

sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **media**

larghezza cm.: **5,9**

spessore cm.: **5,9**

altezza cm.: **5,6**

apice: **incavato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **rotonda**

forma trasvers.: **triangolare solcata**

colore polpa: **bianca**

aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **medio**

altezza cm.: **3,1**

larghezza cm.: **2,2**

spessore cm.: **1,8**

colore: **marrone chiaro**

forma: **obovata**

superficie: **con cavità e scanalature**

angolo apicale: **ampio**

simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 32,2
 lunghezza mm: 147
 larghezza mm: 35
 rapp. lung./larg.: 4,2
 posiz. Largh. Max.: *basale*
 aspetto: *liscio*
 ampiezza angolo apicale: *stretto*
 ampiezza angolo basale: *stretto*
 margine: *seghettato*
 glandole: *assenti*



Fiore

tipo: *campanulaceo*
 grandezza: *medio*
 forma petali: *rotondi*
 colore petali: *rosa intenso*
 area petali mm²: 42
 altezza pistillo: *uguali ad antere*

Ramo

lunghezza internodi: *corti*
 colorazione: *prevalentemente rossa*
 distrib. gemme a fiore: *tratto mediano*





Bella di Bivona






Bella di Bivona

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *tardiva*

epoca di maturazione: **+ 48**

produttività: *media*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Bella di Bivona in rapporto alle cultivar in catalogo



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Caratteristiche qualitative

Ph: **4**
 acid. tit.(g/l): **0,8**
 °Brix: **19,6**
 rapporto E/A: **25,1**
 sovraccalore: **39%**
 aroma: **medio**
 sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **piccolo**
 larghezza cm.: **5,6**
 spessore cm.: **5,4**
 altezza cm.: **5,4**
 apice: **incavato**
 umbone: **assente**
 forma longitud.: **oblunga**
 forma trasvers.: **rotonda**
 colore polpa: **bianca**
 aderenza nocciolo: **aderente**




Nocciolo

dimensione: **medio**
 altezza cm.: **3,5**
 larghezza cm.: **2,6**
 spessore cm.: **1,9**
 colore: **marrone**
 forma: **ellittica**
 superficie: **con cavità e scanalature**
 angolo apicale: **molto ampio**
 simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: **33**
lunghezza mm: **137**
larghezza mm: **36**
rapp. lung./larg.: **3.8**
posiz. Largh. Max.: **basale**
aspetto: **ondulato**
ampiezza angolo apicale: **medio**
ampiezza angolo basale: **medio**
margine: **crenato**
glandole: **assenti**



Fiore

tipo: **rosaceo**
grandezza: **medio**
forma petali: **ellittico-allargata**
colore petali: **rosa pallido**
area petali mm²: **191**
altezza pistillo: **inferiori ad antere**

Ramo

lunghezza internodi: **corti**
colorazione: **prevalentemente rossa**
distrib. gemme a fiore: **tratto basale**





Bianca di Bivona






Bianca di Bivona

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *media*

epoca di maturazione: *+ 14*

produttività: *media*



Bianca di Bivona



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Caratteristiche qualitative

Ph: 3,6

acid. tit.(g/l): 0,98

°Brix: 17

rapporto E/A: 17,4

sovraccalore: 37%

aroma: medio

sapore: buono

Frutto

grandezza: piccolo

larghezza cm.: 5,5

spessore cm.: 5,4

altezza cm.: 5,2

apice: incavato

umbone: assente

forma longitud.: oblunga

forma trasvers.: rotonda

colore polpa: bianca

aderenza nocciolo: aderente



Nocciolo

dimensione: medio

altezza cm.: 3,3

larghezza cm.: 2,4

spessore cm.: 1,8

colore: marrone chiaro

forma: ellittica

superficie: con cavità e scanalature

angolo apicale: molto ampio

simmetria: asimmetrico



Foglia

ampiezza lembo cm²: **42**
lunghezza mm: **144**
larghezza mm: **43**
rapp. lung./larg.: **3.4**
posiz. Largh. Max.: **centrale**
aspetto: **ondulato**
ampiezza angolo apicale: **medio**
ampiezza angolo basale: **medio**
margine: **crenato**
glandole: **assenti**



Ramo

lunghezza internodi: **corti**
colorazione: **prevalentemente rossa**
distrib. gemme a fiore: **tratto mediano**



Fiore

tipo: **rosaceo**
grandezza: **medio**
forma petali: **rotonda**
colore petali: **rosa**
area petali mm²: **185**
altezza pistillo: **uguali ad antere**





Bongiovì






Bongiòvi

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *media*

epoca di maturazione: *+ 5*

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Bongiòvi
in rapporto alle cultivar in catalogo



Caratteristiche qualitative

Ph: **3,5**
 acid. tit.(g/l): **1,2**
 °Brix: **14,9**
 rapporto E/A: **12,5**
 sovraccalore: **44%**
 aroma: **lieve**
 sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **media**
 larghezza cm.: **6,1**
 spessore cm.: **5,9**
 altezza cm.: **5,9**
 apice: **arrotondato**
 umbone: **assente**
 forma longitud.: **rotonda**
 forma trasvers.: **triangolare**
solcata
 colore polpa: **bianco-venata**
 aderenza nocciolo: **aderente**




Nocciolo

dimensione: **medio**
 altezza cm.: **3,4**
 larghezza cm.: **2,2**
 spessore cm.: **1,7**
 colore: **marrone chiaro**
 forma: **obovata**
 superficie: **con scanalature**
 angolo apicale: **medio**
 simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 53
 lunghezza mm: 160
 larghezza mm: 48
 rapp. lung./larg.: 3.3
 posiz. Largh. Max.: centrale
 aspetto: ondulato
 ampiezza angolo apicale: media
 ampiezza angolo basale: media
 margine: crenato
 glandole: globose



Fiore

tipo: campanulaceo
 grandezza: media
 forma petali: rotonda
 colore petali: rosa pallido
 area petali mm²: 59
 altezza pistillo: uguali ad antere

Ramo

lunghezza internodi: corti
 colorazione: prevalentemente rossa
 distrib. gemme a fiore: tratto mediano





Bordò






Bordò


Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *precoce*

epoca di maturazione: *+ 52*

produttività: *bassa*





Bordò

Caratteristiche qualitative

Ph: *4,0*

acid. tit.(g/l): *0,83*

°Brix: *22,3*

rapporto E/A: *26,8*

sovraccolore: *48%*

aroma: *medio*

sapore: *buono*

Frutto

grandezza: *piccola*

larghezza cm.: *4,9*

spessore cm.: *4,7*

altezza cm.: *4,7*

apice: *incavato*

umbone: *assente*

forma longitud.: *oblunga*

forma trasvers.: *triangolare
solcata*

colore polpa: *bianco-venata*

aderenza nocciolo: *aderente*



Nocciolo

dimensione: *medio*

altezza cm.: *3,2*

larghezza cm.: *2,5*

spessore cm.: *1,9*

colore: *rosso*

forma: *obovata*

superficie: *con cavità e scanalature*


angolo apicale: *molto ampio*

simmetria: *asimmetrico*



Foglia

ampiezza lembo cm²: 37,4
 lunghezza mm: 146
 larghezza mm: 37
 rapp. lung./larg.: 3.9
 posiz. Largh. Max.: *basale*
 aspetto: *liscio*
 ampiezza angolo apicale: *medio*
 ampiezza angolo basale: *stretto*
 margine: *crenato*
 glandole: *reniformi*

**Fiore**

tipo: *rosaceo*
 grandezza: *media*
 forma petali: *rotonda*
 colore petali: *rosa*
 area petali mm²: 190
 altezza pistillo: *inferiori ad antere*

Ramo

lunghezza internodi: *corti*
 colorazione: *prevalentemente rossa*
 distrib. gemme a fiore: *tratto mediano*





Burgitana






Burgitana

Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *media*


epoca di maturazione: *+ 17*

produttività: *alta*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Burgitana in rapporto alle cultivar in catalogo

Burgitana



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Caratteristiche qualitative

Ph: **3,5**

acid. tit.(g/l): **1,13**

°Brix: **15,6**

rapporto E/A: **13,8**

sovraccalore: **61%**

aroma: **lieve**

sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **piccola**

larghezza cm.: **5,7**

spessore cm.: **5,7**

altezza cm.: **5,8**

apice: **incavato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **oblunga**

forma trasvers.: **rotonda**

colore polpa: **bianco-venata**

aderenza nocciolo: **non aderente**



Nocciolo

dimensione: **medio**

altezza cm.: **3,6**

larghezza cm.: **2,5**

spessore cm.: **1,8**

colore: **rosso**

forma: **obovata**

superficie: **con cavità e scanalature**

angolo apicale: **medio**

simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 35,8
lunghezza mm: 148
larghezza mm: 36
rapp. lung./larg.: 4.1
posiz. Largh. Max.: *centrale*
aspetto: *increspato lungo la nervatura*
ampiezza angolo apicale: *stretto*
ampiezza angolo basale: *stretto*
margine: *crenato*
glandole: *assenti*



Fiore

tipo: *campanulaceo*
grandezza: *media*
forma petali: *rotonda*
colore petali: *rosa intenso*
area petali mm²: 59
altezza pistillo: *superiori ad antere*


Ramo

lunghezza internodi: *corti*
colorazione: *prevalentemente verde*
distrib. gemme a fiore: *tratto mediano*






Corleonese



produttività: *media*



Caratteristiche qualitative

Ph: **3,7**
 acid. tit.(g/l): **0,94**
 °Brix: **17,7**
 rapporto E/A: **18,9**
 sovraccalore: **32%**
 aroma: **medio**
 sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **piccola**
 Larghezza cm.: **5,3**
 spessore cm.: **5,2**
 altezza cm.: **5,3**
 apice: **incavato**
 umbone: **assente**
 forma longitud.: **rotonda**
 forma trasvers.: **rotonda**
 colore polpa: **bianca**
 aderenza nocciolo: **aderente**




Nocciolo

dimensione: **media**
 altezza cm.: **3,1**
 larghezza cm.: **2,3**
 spessore cm.: **1,7**
 colore: **marrone chiaro**
 forma: **ellittica**
 superficie: **con cavità e scanalature**
 angolo apicale: **ampio**
 simmetria: **simmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 48,7
 lunghezza mm: 153
 larghezza mm: 46
 rapp. lung./larg.: 3,34
 posiz. Largh. Max.: basale
 aspetto: ondulato
 ampiezza angolo apicale: medio
 ampiezza angolo basale: medio
 margine: crenato
 glandole: reniformi



Ramo

lunghezza internodi: corti
 colorazione: prevalentemente rossa
 distrib. gemme a fiore: tratto mediano



Fiore

tipo: rosaceo
 grandezza: grande
 forma petali: rotonda
 colore petali: rosa pallido
 area petali mm²: 197
 altezza pistillo: uguali ad antere





Cammarata






Kamarat

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *precoce*

epoca di maturazione: **+ 53**

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Kamarat
in rapporto alle cultivar in catalogo



Caratt. qualitative

pH: **3,6**

acid. tit.(g/l): **1,01**

Brix: **15**

rapporto E/A: **14,8**

sovraccolore: **8 %**

aroma: **medio**

sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **piccolo**

larghezza cm.: **5,6**

spessore cm.: **5,5**

altezza cm.: **5,3**

apice: **incavato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **rotonda**

forma trasvers.: **a sutura depressa**

colore polpa: **bianca**

aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **grande**

altezza cm.: **3,5**

larghezza cm.: **2,6**

spessore cm.: **1,9**

colore: **marrone scuro**

forma: **ellittica**

superficie: **con scanalature**


angolo apicale: **ampio**

simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 41,3
 lunghezza mm: 139
 larghezza mm: 44
 rapp. lung./larg.: 3.1
 posiz. Largh. Max.: *centrale*
 aspetto: *increspato lungo la nervatura*
 ampiezza angolo apicale: *medio*
 ampiezza angolo basale: *medio*
 margine: *seghettato*
 glandole: *assenti*



Ramo

lunghezza internodi: *media*
 colorazione: *prevalentemente rossa*
 distrib. gemme a fiore: *tratto mediano*



Fiore

tipo: *campanulaceo*
 grandezza: *media*
 forma petali: *ellittico allungata*
 colore petali: *rosa pallido*
 area petali mm²: 45
 altezza pistillo: *uguali ad antere*





Lugliatica






Lugliatica

Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *precoce*


epoca di maturazione: *+1*

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Lugliatica
in rapporto alle cultivar in catalogo

Lugliatica



Caratteristiche qualitative

Ph: **3,5**

acid. tit.(g/l): **1,13**

°Brix: **13,5**

rapporto E/A: **12**

sovraccolore: **44%**

aroma: **lieve**

sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **media**

Larghezza cm.: **6,2**

spessore cm.: **6**

altezza cm.: **6**

apice: **arrotondato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **oblunga**

forma trasvers.: **triangolare solcata**

colore polpa: **bianco - venata**

aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **medio**

altezza cm.: **3,4**

larghezza cm.: **2,4**

spessore cm.: **1,9**

colore: **marrone scuro**

forma: **obovata**

superficie: **con scanalature**

angolo apicale: **ampio**

simmetria: **simmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 46,2
 lunghezza mm: 147
 larghezza mm: 46
 rapp. lung./larg.: 3,2
 posiz. Largh. Max.: *centrale*
 aspetto: *ondulato*
 ampiezza angolo apicale: *medio*
 ampiezza angolo basale: *medio*
 margine: *crenato*
 glandole: *assenti*



Fiore

tipo: *campanulaceo*
 grandezza: *grande*
 forma petali: *ellittico-allungata*
 colore petali: *rosa*
 area petali mm²: 143
 altezza pistillo: *uguali ad antere*

Ramo

lunghezza internodi: *medi*
 colorazione: *prevalentemente rossa*
 distrib. gemme a fiore: *tratto apicale*





Montagnola Bianca Sciacca






Montagnola Bianca Sclacca


Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *precoce*

epoca di maturazione: *+ 7*

produttività: *alta*





Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Montagnola Bianca Sciacca

Caratteristiche qualitative

Ph: 3,6

acid. tit.(g/l): 1,0

°Brix: 14,5

rapporto E/A: 14,5

sovraccoloro: 49%

aroma: *lieve*

sapore: *discreto*

Frutto

grandezza: *piccola*

Larghezza cm.: 5,6

spessore cm.: 5,7

altezza cm.: 5,7

apice: *incavato*

umbone: *assente*

forma longitud.: *oblunga*

forma trasvers.: *triangolare
solcata*

colore polpa: *bianco-rosata*

aderenza nocciolo: *aderente*



Nocciolo

dimensione: *medio*

altezza cm.: 3,3

larghezza cm.: 2,3

spessore cm.: 1,7

colore: *marrone chiaro*

forma: *ellittica*

superficie: *con cavità e scanalature*

angolo apicale: *medio*

simmetria: *simmetrico*



Foglia

ampiezza lembo cm²: 40,4
lunghezza mm: 141
larghezza mm: 42
rapp. lung./larg.: 3,4
posiz. Largh. Max.: basale
aspetto: ondulato
ampiezza angolo apicale: medio
ampiezza angolo basale: medio
margine: crenato
glandole: globose



Fiore

tipo: rosaceo
grandezza: grande
forma petali: rotonda
colore petali: rosa pallido
area petali mm²: 293
altezza pistillo: uguali ad antere

Ramo

lunghezza internodi: medi
colorazione: prevalentemente rossa
distrib. gemme a fiore: tratto mediano





Russotta






Russotta

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *precoce*

epoca di maturazione: *- 18*

produttività: *alta*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Russotta
in rapporto alle cultivar in catalogo



Russotta

Caratteristiche qualitative

Ph: **3,5**

acid. tit.(g/l): **1,0**

°Brix: **12,2**

rapporto E/A: **12,2**

sovraccalore: **77%**

aroma: **intenso**

sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **piccola**

larghezza cm.: **5,4**

spessore cm.: **5,4**

altezza cm.: **5,6**

apice: **arrotondato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **oblunga**

forma trasvers.: **a sutura depressa**

colore polpa: **bianco - venata**

aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **media**

altezza cm.: **3,1**

larghezza cm.: **2,2**

spessore cm.: **1,9**

colore: **marrone**

forma: **ellittica**

superficie: **con cavità e scanalature**

angolo apicale: **ampio**

simmetria: **simmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 40
 lunghezza mm: 147
 larghezza mm: 39
 rapp. lung./larg.: 3,8
 posiz. Largh. Max.: basale
 aspetto: ondulato
 ampiezza angolo apicale: stretto
 ampiezza angolo basale: stretto
 margine: crenato
 glandole: assenti



Ramo

lunghezza internodi: medi
 colorazione: prevalentemente rossa
 distrib. gemme a fiore: tratto apicale



Fiore

tipo: rosaceo
 grandezza: grande
 forma petali: rotonda
 colore petali: rosa pallido
 area petali mm²: 269
 altezza pistillo: uguali ad antere





Sbergia bianca






Sbergia bianca

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *media*

epoca di maturazione: **+ 26**

produttività: *media*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Sbergia Bianca
in rapporto alle cultivar in catalogo



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Sbergia bianca

Caratteristiche qualitative

Ph: **3,8**

acid. tit.(g/l): **1,1**

°Brix: **19,8**

rapporto E/A: **18,6**

sovraccalore: **0%**

aroma: **assente**

sapore: **discreto**

Frutto

grandezza: **piccola**

larghezza cm.: **4,3**

spessore cm.: **4,5**

altezza cm.: **4,0**

apice: **incavato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **oblata**

forma trasvers.: **rotonda**

colore polpa: **bianca**

aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **piccolo**

altezza cm.: **2,4**

larghezza cm.: **2,1**

spessore cm.: **1,8**

colore: **marrone**

forma: **rotonda**

superficie: **con cavità e scanalature**

angolo apicale: **molto ampio**

simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 28,5
lunghezza mm: 132
larghezza mm: 32
rapp. lung./larg.: 4,15
posiz. Largh. Max.: basale
aspetto: ondulato
ampiezza angolo apicale: stretto
ampiezza angolo basale: stretto
margine: crenato
glandole: globose



Ramo

lunghezza internodi: corti
colorazione: prevalentemente rossa
distrib. gemme a fiore: tratto mediano



Fiore

tipo: rosaceo
grandezza: medio
forma petali: ellittico-allungati
colore petali: rosa molto pallido
area petali mm²: 143
altezza pistillo: superiori ad antere





Settembrina






Settembrina


Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *media*

epoca di maturazione: **+ 26**

produttività: *media*





Caratteristiche qualitative

Ph: **3,7**

acid. tit.(g/l): **0,9**

°Brix: **17,1**

rapporto E/A: **18,8**

sovraccalore: **39%**

aroma: **medio**

sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **piccolo**

larghezza cm.: **5**

spessore cm.: **4,8**

altezza cm.: **5**

apice: **incavato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **oblunga**

forma trasvers.: **rotonda**

colore polpa: **bianco-venata**

aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **media**

altezza cm.: **3**

larghezza cm.: **2,4**

spessore cm.: **1,7**

colore: **marrone**

forma: **ellittica**

superficie: **con cavità e scanalature**


angolo apicale: **molto ampio**

simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 43,9
 lunghezza mm: 143
 larghezza mm: 45
 rapp. lung./larg.: 3,2
 posiz. Largh. Max.: *centrale*
 aspetto: *increspato lungo la nervatura*
 ampiezza angolo apicale: *medio*
 ampiezza angolo basale: *ampio*
 margine: *crenato*
 glandole: *assenti*




Ramo

lunghezza internodi: *corti*
 colorazione: *prevalentemente verde*
 distrib. gemme a fiore: *mediana*



Fiore

tipo: *rosaceo*
 grandezza: *grande*
 forma petali: *rotondi*
 colore petali: *rosa pallido*
 area petali mm²: 201
 altezza pistillo: *uguali ad antere*





Settembrina di Leonforte






Settembrina di Leonforte

Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *precoce*


epoca di maturazione: *+ 60*

produttività: *media*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Settembrina di Leonforte in rapporto alle cultivar in catalogo

Settembrina di Leonforte



Caratteristiche qualitative

Ph: **3,9**

acid. tit.(g/l): **0,9**

°Brix: **21,8**

rapporto E/A: **23,9**

sovraccolore: **5%**

aroma: **lieve**

sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **piccolo**

larghezza cm.: **4,5**

spessore cm.: **4,3**

altezza cm.: **4,3**

apice: **incavato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **oblunga**

forma trasvers.: **rotonda**

colore polpa: **bianca**

aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **medio**

altezza cm.: **3,1**

larghezza cm.: **2,4**

spessore cm.: **1,8**

colore: **marrone scuro**

forma: **ellittica**

superficie: **con cavità e scanalature**


angolo apicale: **ampio**

simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: **39,4**
lunghezza mm: **132**
larghezza mm: **43**
rapp. lung./larg.: **3,1**
posiz. Largh. Max.: **centrale**
aspetto: **ondulato**
ampiezza angolo apicale: **ampio**
ampiezza angolo basale: **stretto**
margine: **crenato**
glandole: **reniformi**



Ramo

lunghezza internodi: **medi**
colorazione: **prevalentemente rosso**
distrib. gemme a fiore: **tratto mediano**




Fiore

tipo: **rosaceo**
grandezza: **piccolo**
forma petali: **ellittico-allungati**
colore petali: **rosa pallido**
area petali mm²: **99,47**
altezza pistillo: **inferiori ad antere**





Tabacchiera Caudullo






Tabacchiera Caudullo

Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *tardiva*


epoca di maturazione: *+ 8*

produttività: *media*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Tabacchiera Caudullo in rapporto alle cultivar in catalogo

Tabacchiera Caudullo



Caratteristiche qualitative

Ph: 4,6

acid. tit.(g/l): 0,29

°Brix: 15,6

rapporto E/A: 54,7

sovraccalore: 50%

aroma: *assente*

sapore: *discreto*

Frutto

grandezza: *piccolo*

larghezza cm.: 5,5

spessore cm.: 5,8

altezza cm.: 3,1

apice: *incavato*

umbone: *assente*

forma longitud.: *piatta*

forma trasvers.: *a sutura depressa*

colore polpa: *bianca*

aderenza nocciolo: *non aderente*



Nocciolo

dimensione: *piccolo*

altezza cm.: 1,3

larghezza cm.: 2

spessore cm.: 2

colore: *rosso*

forma: *oblata*

superficie: *con piccole cavità*

angolo apicale: *molto ampio*

simmetria: *simmetrico*



Foglia

ampiezza lembo cm²: **29,68**
lunghezza mm: **125**
larghezza mm: **35**
rapp. lung./larg.: **3,6**
posiz. Largh. Max.: **centrale**
aspetto: **liscia**
ampiezza angolo apicale: **medio**
ampiezza angolo basale: **stretto**
margine: **crenato**
glandole: **reniformi**



Ramo

lunghezza internodi: **corti**
colorazione: **prevalentemente rossa**
distrib. gemme a fiore: **tratto mediano**



Fiore

tipo: **rosaceo**
grandezza: **grande**
forma petali: **ellittico allungati**
colore petali: **rosa molto pallido**
area petali mm²: **224**
altezza pistillo: **uguali ad antere**





Tabacchiera Currao






Tabacchiera Currao

Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *precoce*


epoca di maturazione: - 7

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Tabacchiera Currao in rapporto alle cultivar in catalogo

Tabacchiera Currao



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Caratteristiche qualitative

Ph: **4,6**

acid. tit.(g/l): **0,26**

°Brix: **14**

rapporto E/A: **45,6**

sovraccolore: **92%**

aroma: **lieve**

sapore: **discreto**

Frutto

grandezza: **piccolo**

larghezza cm.: **4,8**

spessore cm.: **5**

altezza cm.: **2,4**

apice: **incavato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **piatta**

forma trasvers.: **a sutura depressa**

colore polpa: **bianca**

aderenza nocciolo: **non aderente**



Nocciolo

dimensione: **piccolo**

altezza cm.: **1,0**

larghezza cm.: **1,5**

spessore cm.: **1,4**

colore: **marrone chiaro**

forma: **oblata**

superficie: **con grosse cavità**


angolo apicale: **molto ampio**

simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 33,2
 lunghezza mm: 130
 larghezza mm: 39
 rapp. lung./larg.: 3,4
 posiz. Largh. Max.: *basale*
 aspetto: *ondulata*
 ampiezza angolo apicale: *medio*
 ampiezza angolo basale: *stretto*
 margine: *crenato*
 glandole: *globose*



Ramo

lunghezza internodi: *corti*
 colorazione: *prevalentemente verde*
 distrib. gemme a fiore: *tratto mediano*




Fiore

tipo: *rosaceo*
 grandezza: *medio*
 forma petali: *rotondi*
 colore petali: *rosa*
 area petali mm²: 188
 altezza pistillo: *inferiori ad antere*





Tabacchiera Moschetti






Tabacchiera Moschetti

Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *media*


epoca di maturazione: *+ 6*

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Tabacchiera Moschetti in rapporto alle cultivar in catalogo

Tabacchiera Moschetti



Caratteristiche qualitative

Ph: 4,3
acid. tit.(g/l): 0,32
°Brix: 18
rapporto E/A: 56,3
sovraccolore: 57%
aroma: *assente*
sapore: *medio*

Frutto

grandezza: *piccola*
larghezza cm.: 5,4
spessore cm.: 5,6
altezza cm.: 2,9
apice: *incavato*
umbone: *assente*
forma longitud.: *piatta*
forma trasvers.: *a sutura depressa*
colore polpa: *bianca*
aderenza nocciolo: *aderente*




Nocciolo

dimensione: *piccolo*
altezza cm.: 1,3
larghezza cm.: 1,9
spessore cm.: 1,8
colore: *marrone*
forma: *oblata*
superficie: *con grosse cavità*
angolo apicale: *molto ampio*
simmetria: *asimmetrico*



Foglia

ampiezza lembo cm²: **35**
 lunghezza mm: **145**
 larghezza mm: **38**
 rapp. lung./larg.: **3,8**
 posiz. Largh. Max.: **basale**
 aspetto: **ondulato**
 ampiezza angolo apicale: **stretto**
 ampiezza angolo basale: **medio**
 margine: **crenato**
 glandole: **assenti**



Ramo

lunghezza internodi: **medi**
 colorazione: **prevalentemente rossa**
 distrib. gemme a fiore: **tratto apicale**




Fiore

tipo: **rosaceo**
 grandezza: **grande**
 forma petali: **ellittico allungati**
 colore petali: **rosa pallido**
 area petali mm²: **206**
 altezza pistillo: **superiori ad antere**





Tabacchiera precoce Caudullo






Tabacchiera precoce Caudullo

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *precoce*

epoca di maturazione: *- 10*

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Tabacchiera precoce Caudullo in rapporto alle cultivar in catalogo



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Tabacchiera precoce Caudullo

Caratteristiche qualitative

Ph: 4,2
acid. tit.(g/l): 0,4
°Brix: 14,1
rapporto E/A: 35,6
sovraccolore: 69%
aroma: *lieve*
sapore: *medio*

Frutto

grandezza: *piccola*
larghezza cm.: 5,1
spessore cm.: 5,4
altezza cm.: 2,7
apice: *incavato*
umbone: *assente*
forma longitud.: *piatta*
forma trasvers.: *ovata*
colore polpa: *bianca*
aderenza nocciolo: *aderente*



Nocciolo

dimensione: *piccolo*
altezza cm.: 1,1
larghezza cm.: 1,6
spessore cm.: 1,5
colore: *marrone chiaro*
forma: *oblata*
superficie: *con grossa cavità*
angolo apicale: *molto ampio*
simmetria: *asimmetrico*



Foglia

ampiezza lembo cm²: **35**
lunghezza mm: **130**
larghezza mm: **39**
rapp. lung./larg.: **3,3**
posiz. Largh. Max.: **basale**
aspetto: **incriespato lungo la nervatura**
ampiezza angolo apicale: **medio**
ampiezza angolo basale: **medio**
margine: **crenato**
glandole: **globose**



Ramo

lunghezza internodi: **corti**
colorazione: **prevalentemente rossa**
distrib. gemme a fiore: **tratto mediano**




Fiore

tipo: **rosaceo**
grandezza: **grande**
forma petali: **rotondi**
colore petali: **rosa pallido**
area petali mm²: **214**
altezza pistillo: **uguali ad antere**





Tabacchiera precoce Moschetti






Tabacchiera precoce Moschetti

Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *precoce*


epoca di maturazione: *- 14*

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Tabacchiera precoce Moschetti in rapporto alle cultivar in catalogo

Tabacchiera precoce Moschetti



°brix

Ac.tit.

E/A

Caratteristiche qualitative

Ph: 4,2

acid. tit.(g/l): 0,45

°Brix: 15,1

rapporto E/A: 33,4

sovraccolore: 75%

aroma: *lieve*

sapore: *buono*

Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Frutto

grandezza: *piccola*

larghezza cm.: 4,6

spessore cm.: 4,8

altezza cm.: 2,3

apice: *incavato*

umbone: *assente*

forma longitud.: *piatta*

forma trasvers.: *oblata*

colore polpa: *bianco-venata*

aderenza nocciolo: *semispicca*



Nocciolo

dimensione: *piccolo*

altezza cm.: 1

larghezza cm.: 1,5

spessore cm.: 1,4

colore: *marrone chiaro*

forma: *oblata*

superficie: *con piccole cavità*

angolo apicale: *molto ampio*

simmetria: *asimmetrico*



Foglia

ampiezza lembo cm²: **41**
lunghezza mm: **138**
larghezza mm: **44**
rapp. lung./larg.: **3,1**
posiz. Largh. Max.: **basale**
aspetto: **incurvato lungo la nervatura**
ampiezza angolo apicale: **medio**
ampiezza angolo basale: **medio**
margine: **crenato**
glandole: **assenti**



Ramo

lunghezza internodi: **lunghi**
colorazione: **prevalentemente rossa**
distrib. gemme a fiore: **tratto apicale**




Fiore

tipo: **rosaceo**
grandezza: **grande**
forma petali: **ellittico-allungati**
colore petali: **rosa**
area petali mm²: **193**
altezza pistillo: **uguali ad antere**





Tùdia






Tùdia

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *media*

epoca di maturazione: **+ 89**

produttività: *media*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Tùdia
in rapporto alle cultivar in catalogo



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Caratt. qualitative

pH: **3,6**

acid. tit.(g/l): **0,72**

Brix: **9,7**

rapporto E/A: **13,5**

sovraccolore: **30 %**

aroma: **lieve**

sapore: **medio**

Frutto

grandezza: **piccolo**

larghezza cm.: **5,6**

spessore cm.: **5,5**

altezza cm.: **6**

apice: **sporgente**

umbone: **presente**

forma longitud.: **ovata**

forma trasvers.: **ellittica**

colore polpa: **bianca**

aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **grande**

altezza cm.: **4,2**

larghezza cm.: **2,7**

spessore cm.: **2,1**

colore: **marrone scuro**

forma: **ellittica**

superficie: **con cavità e scanalature**

angolo apicale: **stretto**

simmetria: **simmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: **32**
 lunghezza mm: **120**
 larghezza mm: **38**
 rapp. lung./larg.: **3.1**
 posiz. Largh. Max.: **basale**
 aspetto: **ondulato**
 ampiezza angolo apicale: **medio**
 ampiezza angolo basale: **medio**
 margine: **crenato**
 glandole: **globose**



Ramo

lunghezza internodi: **corti**
 colorazione: **prevalentemente verde**
 distrib. gemme a fiore: **tratto basale**



Fiore

tipo: **campanulaceo**
 grandezza: **media**
 forma petali: **ellittico allungati**
 colore petali: **rosa pallido**
 area petali mm²: **36**
 altezza pistillo: **uguali ad antere**





Vinci a rose






Vinci a rose

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *tardiva*

epoca di maturazione: *- 11*

produttività: *media*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Vinci a rose
in rapporto alle cultivar in catalogo



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Caratteristiche qualitative

Ph: **3,3**

acid. tit.(g/l): **1,16**

°Brix: **12,2**

rapporto E/A: **10,5**

sovraccalore: **64%**

aroma: **medio**

sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **piccola**

larghezza cm.: **5,4**

spessore cm.: **5,2**

altezza cm.: **5,3**

apice: **incavato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **oblunga**

forma trasvers.: **rotonda**

colore polpa: **bianco-venata**

aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **piccolo**

altezza cm.: **2,9**

larghezza cm.: **2,1**

spessore cm.: **1,7**

colore: **marrone chiaro**

forma: **ellittica**

superficie: **con cavità e scanalature**


angolo apicale: **medio**

simmetria: **simmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 43
 lunghezza mm: 146
 larghezza mm: 43
 rapp. lung./larg.: 3,4
 posiz. Largh. Max.: basale
 aspetto: ondulato
 ampiezza angolo apicale: medio
 ampiezza angolo basale: medio
 margine: crenato
 glandole: reniformi



Fiore

tipo: rosaceo
 grandezza: medio
 forma petali: rotondi
 colore petali: rosa molto pallido
 area petali mm²: 157
 altezza pistillo: uguali ad antere

Ramo

lunghezza internodi: corti
 colorazione: prevalentemente rossa
 distrib. gemme a fiore: tratto mediano





Xirbi






Xirbi

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *precoce*

epoca di maturazione: *+ 60*

produttività: *media*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Xirbi
in rapporto alle cultivar in catalogo



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Caratteristiche qualitative

Ph: **3,9**
 acid. tit.(g/l): **0,9**
 °Brix: **12,2**
 rapporto E/A: **23,4**
 sovraccolore: **0%**
 aroma: **lieve**
 sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **piccola**
 larghezza cm.: **4,7**
 spessore cm.: **4,5**
 altezza cm.: **4,5**
 apice: **arrotondato**
 umbone: **assente**
 forma longitud.: **rotonda**
 forma trasvers.: **rotonda**
 colore polpa: **bianco-venata**
 aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **medio**
 altezza cm.: **3,1**
 larghezza cm.: **2,4**
 spessore cm.: **1,8**
 colore: **rosso**
 forma: **ellittica**
 superficie: **con cavità e scanalature**
 angolo apicale: **ampio**
 simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 29
 lunghezza mm: 124
 larghezza mm: 34
 rapp. lung./larg.: 3,6
 posiz. Largh. Max.: centrale
 aspetto: ondulato
 ampiezza angolo apicale: medio
 ampiezza angolo basale: stretto
 margine: crenato
 glandole: globose

**Fiore**

tipo: rosaceo
 grandezza: medio
 forma petali: ellittico-allargati
 colore petali: rosa molto pallido
 area petali mm²: 157
 altezza pistillo: uguali ad antere

Ramo

lunghezza internodi: corti
 colorazione: prevalentemente verde
 distrib. gemme a fiore: tratto basale



Pesche del germoplasma siciliano a polpa gialla



Agostina di Leonforte






Agostina di Leonforte

Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *precoce*


epoca di maturazione: *+ 21*

produttività: *media*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Agostina di Leonforte in rapporto alle cultivar in catalogo

Agostina di Leonforte



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Caratteristiche qualitative

Ph: **3,8**

acid. tit.(g/l): **0,78**

°Brix: **15,4**

rapporto E/A: **19,8**

sovraccolore: **53 %**

aroma: **assente**

sapore: **buono**

Frutto

grandezza: **piccolo**

larghezza cm.: **5,5**

spessore cm.: **5,8**

altezza cm.: **5,6**

apice: **arrotondato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **rotonda**

forma trasv.: **triang. solcata**

colore polpa: **gialla**

aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **medio**

Altezza cm.: **3,1**

Larghezza cm.: **2,2**

Spessore cm.: **1,6**

colore: **marrone scuro**

forma: **obovata**

superficie: con **cavità e scanalature**

angolo apicale: **medio**

simmetria: **simmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 35
lunghezza mm: 128
larghezza mm: 39
rapp. lung./larg.: 3.3
posiz. Largh. Max.: *basale*
aspetto: *increspato lungo la nerv. centr.*
ampiezza angolo apicale: *medio*
ampiezza angolo basale: *stretto*
margine: *crenato*
glandole: *assenti*



Ramo

lunghezza internodi: *corti*
colorazione: *prevalentemente rossa*
distrib. gemme a fiore: *tratto mediano*



Fiore

tipo: *campanulaceo*
grandezza: *medio*
forma petali: *rotonda*
colore petali: *rosa intenso*
area petali mm²: 24
altezza pistillo: *inferiori ad antere*





Gialla di Moavero






Gialla di Moavero

Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *tardiva*


epoca di maturazione: *+ 60*

produttività: *media*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Gialla di Moavero in rapporto alle cultivar in catalogo

Gialla di Moavero



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Caratteristiche qualitative

Ph: **3,6**
 acid. tit.(g/l): **1,19**
 °Brix: **20,4**
 rapporto E/A: **17,2**
 sovraccolore: **2%**
 aroma: **lieve**
 sapore: **discreto**

Frutto

grandezza: **piccola**
 Larghezza cm.: **5,1**
 spessore cm.: **5,1**
 altezza cm.: **4,9**
 apice: **arrotondato**
 umbone: **assente**
 forma longitud.: **oblunga**
 forma trasvers.: **triangolare solcata**
 colore polpa: **gialla**
 aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **media**
 altezza cm.: **3,3**
 larghezza cm.: **2,5**
 spessore cm.: **1,9**
 colore: **marrone scuro**
 forma: **obovata**
 superficie: **con cavità e scanalature**
 angolo apicale: **medio**
 simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: **37,3**
lunghezza mm: **158**
larghezza mm: **36**
rapp. lung./larg.: **4,4**
posiz. Largh. Max.: **basale**
aspetto: **liscio**
ampiezza angolo apicale: **stretto**
ampiezza angolo basale: **stretto**
margine: **crenato**
glandole: **assenti**



Fiore

tipo: **rosaceo**
grandezza: **media**
forma petali: **rotonda**
colore petali: **rosa pallido**
area petali mm²: **184**
altezza pistillo: **superiori ad antere**

Ramo

lunghezza internodi: **corti**
colorazione: **prevalentemente verde**
distrib. gemme a fiore: **tratto mediano**





Ottobrina Caltagirone






Ottobrina Caltagirone

Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *media*


epoca di maturazione: + 60

produttività: *media*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Ottobrina Caltagirone in rapporto alle cultivar in catalogo

Ottobrino Caltagirone



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Caratteristiche qualitative

Ph: **3,7**
 acid. tit.(g/l): **0,97**
 °Brix: **20,3**
 rapporto E/A: **21**
 sovraccolore: **5%**
 aroma: **lieve**
 sapore: **discreto**

Frutto

grandezza: **piccola**
 Larghezza cm.: **4,5**
 spessore cm.: **4,5**
 altezza cm.: **4,2**
 apice: **incavato**
 umbone: **assente**
 forma longitud.: **oblunga**
 forma trasvers.: **rotonda**
 colore polpa: **gialla**
 aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **medio**
 altezza cm.: **2,9**
 larghezza cm.: **2,4**
 spessore cm.: **1,6**
 colore: **marrone**
 forma: **obovata**
 superficie: **con cavità e scanalature**
 angolo apicale: **medio**
 simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 34,8
 lunghezza mm: 136
 larghezza mm: 36
 rapp. lung./larg.: 3,7
 posiz. Largh. Max.: basale
 aspetto: ondulato
 ampiezza angolo apicale: medio
 ampiezza angolo basale: medio
 margine: crenato
 glandole: globose



Fiore

tipo: rosaceo
 grandezza: medio
 forma petali: rotonda
 colore petali: rosa pallido
 area petali mm²: 137
 altezza pistillo: uguali ad antere


Ramo

lunghezza internodi: corti
 colorazione: prevalentemente verde
 distrib. gemme a fiore: tratto mediano





Settembrina di Bronte






Settembrina di Bronte

Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *precoce*


epoca di maturazione: *+ 64*

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Settembrina di Bronte in rapporto alle cultivar in catalogo

Settembrina di Bronte



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Caratteristiche qualitative

Ph: 3,7
acid. tit.(g/l): 1,26
°Brix: 22,4
rapporto E/A: 17,7
sovraccolore: 9%
aroma: *lieve*
sapore: *buono*

Frutto

grandezza: *piccola*
larghezza cm.: 4,9
spessore cm.: 4,9
altezza cm.: 4,8
apice: *incavato*
umbone: *assente*
forma longitud.: *oblata*
forma trasvers.: *a sutura depressa*
colore polpa: *gialla*
aderenza nocciolo: *aderente*




Nocciolo

dimensione: *grande*
altezza cm.: 3,5
larghezza cm.: 2,6
spessore cm.: 2
colore: *marrone scuro*
forma: *obovata*
superficie: *con cavità e scanalature*
angolo apicale: *molto ampio*
simmetria: *asimmetrico*



Foglia

ampiezza lembo cm²: 39,9
lunghezza mm: 120
larghezza mm: 38
rapp. lung./larg.: 3,1
posiz. Largh. Max.: basale
aspetto: ondulato
ampiezza angolo apicale: medio
ampiezza angolo basale: medio
margine: crenato
glandole: reniformi



Ramo

lunghezza internodi: medi
colorazione: prevalentemente rossa
distrib. gemme a fiore: tratto mediano



Fiore

tipo: campanulaceo
grandezza: medio
forma petali: rotondi
colore petali: rosa
area petali mm²: 46
altezza pistillo: superiori ad antere





Settembrina di Caltagirone






Settembrina di Caltagirone

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *media*

epoca di maturazione: *+ 60*

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Settembrina di Caltagirone in rapporto alle cultivar in catalogo



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Settembrina di Caltagirone

Caratteristiche qualitative

Ph: **3,6**

acid. tit.(g/l): **1,16**

°Brix: **21,2**

rapporto E/A: **18,2**

sovraccolore: **0%**

aroma: **lieve**

sapore: **discreto**

Frutto

grandezza: **piccola**

larghezza cm.: **4,6**

spessore cm.: **4,6**

altezza cm.: **4,6**

apice: **arrotondato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **oblata**

forma trasvers.: **a triangolare solcata**

colore polpa: **gialla**

aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **medio**

altezza cm.: **3,2**

larghezza cm.: **2,4**

spessore cm.: **1,7**

colore: **marrone chiaro**

forma: **obovata**

superficie: **con cavità e scanalature**

angolo apicale: **ampio**

simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 33,3
lunghezza mm: 140
larghezza mm: 34
rapp. lung./larg.: 4,1
posiz. Largh. Max.: *basale*
aspetto: *increspato lungo la nervatura centrale*
ampiezza angolo apicale: *stretto*
ampiezza angolo basale: *stretto*
margine: *crenato*
glandole: *assenti*



Ramo

lunghezza internodi: *corti*
colorazione: *prevalentemente verde*
distrib. gemme a fiore: *tratto mediano*




Fiore

tipo: *rosaceo*
grandezza: *medio*
forma petali: *rotondi*
colore petali: *rosa*
area petali mm²: 175
altezza pistillo: *superiori ad antere*





Tabacchiera gialla tardiva






Tabacchiera gialla tardiva

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *media*

epoca di maturazione: *+ 14*

produttività: *alta*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Tabacchiera Gialla Tardiva in rapporto alle cultivar in catalogo



Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Tabacchiera gialla tardiva

Caratteristiche qualitative

Ph: **4,5**
 acid. tit.(g/l): **0,27**
 °Brix: **15,3**
 rapporto E/A: **55,8**
 sovraccalore: **63%**
 aroma: **assente**
 sapore: **discreto**

Frutto

grandezza: **piccola**
 larghezza cm.: **5,8**
 spessore cm.: **6**
 altezza cm.: **3,1**
 apice: **incavato**
 umbone: **assente**
 forma longitud.: **piatta**
 forma trasvers.: **triangolare solcata**
 colore polpa: **gialla**
 aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **piccolo**
 altezza cm.: **1,3**
 larghezza cm.: **1,9**
 spessore cm.: **1,8**
 colore: **marrone**
 forma: **oblata**
 superficie: **con grosse cavità**
 angolo apicale: **molto ampio**
 simmetria: **simmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: **34**
lunghezza mm: **140**
larghezza mm: **39**
rapp. lung./larg.: **3,6**
posiz. Largh. Max.: **basale**
aspetto: **ondulato**
ampiezza angolo apicale: **stretto**
ampiezza angolo basale: **medio**
margine: **crenato**
glandole: **reniformi**



Fiore

tipo: **campanulaceo**
grandezza: **grande**
forma petali: **ellittico allungati**
colore petali: **rosa pallido**
area petali mm²: **82**
altezza pistillo: **inferiori ad antere**

Ramo

lunghezza internodi: **medi**
colorazione: **prevalentemente rossa**
distrib. gemme a fiore: **tratto mediano**





Tardivo di Leonforte






Tardivo di Leonforte


Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *precoce*

epoca di maturazione: *+ 64*

produttività: *media*





Tardivo di Leonforte

Caratteristiche qualitative

Ph: 3,7

acid. tit.(g/l): 1,2

°Brix: 21,8

rapporto E/A: 17,9

sovraccalore: 2%

aroma: *lieve*

sapore: *buono*

Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle cv presenti in catalogo

Frutto

grandezza: *piccola*

larghezza cm.: 4,4

spessore cm.: 4,5

altezza cm.: 4,5

apice: *arrotondato*

umbone: *assente*

forma longitud.: *ovata*

forma trasvers.: *rotonda*

colore polpa: *gialla*

aderenza nocciolo: *aderente*



Nocciolo

dimensione: *medio*

altezza cm.: 3,1

larghezza cm.: 2,5

spessore cm.: 1,8

colore: *marrone scuro*

forma: *obovata*

superficie: *con cavità e scanalature*

angolo apicale: *molto ampio*

simmetria: *simmetrico*



Foglia

ampiezza lembo cm²: 40
lunghezza mm: 136
larghezza mm: 42
rapp. lung./larg.: 3,2
posiz. Largh. Max.: centrale
aspetto: ondulato
ampiezza angolo apicale: medio
ampiezza angolo basale: medio
margine: crenato
glandole: assenti



Fiore

tipo: rosaceo
grandezza: medio
forma petali: rotondi
colore petali: rosa pallido
area petali mm²: 182
altezza pistillo: uguali ad antere

Ramo

lunghezza internodi: medi
colorazione: prevalentemente rossa
distrib. gemme a fiore: tratto mediano



Selezioni avanzate di pesco
a polpa bianca



F1 P23 Venezia Sud




F1 P23 Venezia Sud

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *tardiva*

epoca di maturazione: *- 13*

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Selezione F1 P23 Venezia Sud in rapporto alle selezioni in catalogo



F1 P23 Venezia Sud

Caratt. qualitative

pH: 3,6

acid. tit.(g/l): 1,03

Brix: 16,4

rapporto E/A: 16

sovraccolor: 59 %

aroma: lieve

sapore: discreto

Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle selezioni presenti in catalogo

Frutto

grandezza: *piccolo*

larghezza cm.: 5

spessore cm.: 4,8

altezza cm.: 4,9

apice: *incavato*

umbone: *assente*

forma longitud.: *rotonda*

forma trasvers.: *rotonda*

colore polpa: *bianco venata*

aderenza nocciolo: *aderente*



Nocciolo

dimensione: *medio*

altezza cm.: 2,8

larghezza cm.: 2,2

spessore cm.: 1,8

colore: *rosso*

forma: *obovata*

superficie: *con cavità e scanalature*

angolo apicale: *ampio*

simmetria: *asimmetrico*



Foglia

ampiezza lembo cm²: **27,6**
 lunghezza mm: **127**
 larghezza mm: **33**
 rapp. lung./larg.: **3.8**
 posiz. Largh. Max.: **basale**
 aspetto: **ondulato**
 ampiezza angolo apicale: **stretto**
 ampiezza angolo basale: **stretto**
 margine: **crenato**
 glandole: **assenti**



Ramo

lunghezza internodi: **corti**
 colorazione: **prevalentemente rossa**
 distrib. gemme a fiore: **tratto mediano**



Fiore

tipo: **rosaceo**
 grandezza: **grande**
 forma petali: **ellittico-allungata**
 colore petali: **rosa pallido**
 area petali mm²: **205**
 altezza pistillo: **inferiore ad antere**





F2 P20 Venezia Sud




F2 P20 Venezia Sud

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *precoce*

epoca di maturazione: *- 18*

produttività: *alta*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Selezione F2 P20 Venezia Sud in rapporto alle selezioni in catalogo



F2 P20 Venezia Sud

Caratt. qualitative

pH: 3,4

acid. tit.(g/l): 1,3

Brix: 12

rapporto E/A: 9,5

sovraccogliere: 73 %

aroma: intenso

sapore: medio

Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle selezioni presenti in catalogo

Frutto

grandezza: piccolo

larghezza cm.: 5

spessore cm.: 5

altezza cm.: 4,5

apice: arrotondato

umbone: assente

forma longitud.: oblunga

forma trasvers.: triangolare solcata

colore polpa: bianco venata

aderenza nocciolo: aderente



Nocciolo

dimensione: piccolo

altezza cm.: 2,4

larghezza cm.: 2,1

spessore cm.: 1,6

colore: marrone chiaro

forma: obovata

superficie: con cavità e scanalature

angolo apicale: ampio

simmetria: asimmetrico



Foglia

ampiezza lembo cm²: 38,1
 lunghezza mm: 147
 larghezza mm: 37
 rapp. lung./larg.: 3.9
 posiz. Largh. Max.: basale
 aspetto: ondulato
 ampiezza angolo apicale: stretto
 ampiezza angolo basale: stretto
 margine: crenato
 glandole: globose



tipo: campanulaceo
 grandezza: medio
 forma petali: ellittico-allungata
 colore petali: rosa intenso
 area petali mm²: 37
 altezza pistillo: superiore ad antere

Ramo

lunghezza internodi: corti
 colorazione: prevalentemente rossa
 distrib. gemme a fiore: tratto mediano





F1 P13 Nord




F1 P13 Nord

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *media*

epoca di maturazione: *+ 60*

produttività: *alta*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Selezione F1 P13 Nord in rapporto alle selezioni in catalogo



F1 P13 Nord

Caratt. qualitative

pH: 3,6

acid. tit.(g/l): 1,08

Brix: 19,8

rapporto E/A: 18,3

sovraccalore: 53 %

aroma: assente

sapore: acido

Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle selezioni presenti in catalogo

Frutto

grandezza: piccolo

larghezza cm.: 5,1

spessore cm.: 5

altezza cm.: 5

apice: sporgente

umbone: assente

forma longitud.: rotonda

forma trasvers.: triangolare solcata

colore polpa: bianca

aderenza nocciolo: aderente

Nocciolo

dimensione: medio

altezza cm.: 3,4

larghezza cm.: 2,6

spessore cm.: 1,8

colore: rosso

forma: obovata

superficie: con cavità e scanalature

angolo apicale: ampio

simmetria: asimmetrico



Foglia

ampiezza lembo cm²: 32,6
 lunghezza mm: 135
 larghezza mm: 36
 rapp. lung./larg.: 3.8
 posiz. Largh. Max.: *centrale*
 aspetto: *increspato lungo la nervatura*
 ampiezza angolo apicale: *stretto*
 ampiezza angolo basale: *stretto*
 margine: *crenato*
 glandole: *assenti*



Fiore

tipo: *campanulaceo*
 grandezza: *medio*
 forma petali: *ellittico-allungata*
 colore petali: *rosa*
 area petali mm²: 49
 altezza pistillo: *uguale ad antere*


Ramo

lunghezza internodi: *corti*
 colorazione: *prevalentemente rossa*
 distrib. gemme a fiore: *tratto mediano*





F1 P33 Venezia Nord




F1 P33 Venezia Nord

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *precoce*

epoca di maturazione: **+ 22**

produttività: *media*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Selezione F1 P33 Venezia Nord in rapporto alle selezioni in catalogo



F1 P33 Venezia Nord

Caratt. qualitative

pH: 3,5

acid. tit.(g/l): 1,02

Brix: 14,4

rapporto E/A: 14,2

sovraccoloro: 69 %

aroma: medio

sapore: medio

Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle selezioni presenti in catalogo

Frutto

grandezza: piccolo

larghezza cm.: 5,6

spessore cm.: 5,5

altezza cm.: 5,7

apice: sporgente

umbone: presente

forma longitud.: ellittica

forma trasvers.: rotonda

colore polpa: bianca

aderenza nocciolo: spicca



Nocciolo

dimensione: medio

altezza cm.: 3,3

larghezza cm.: 2,3

spessore cm.: 1,7

colore: rosso

forma: obovata

superficie: con cavità e scanalature

angolo apicale: ampio

simmetria: simmetrico



Foglia

ampiezza lembo cm²: **34,3**
 lunghezza mm: **135**
 larghezza mm: **37**
 rapp. lung./larg.: **3.6**
 posiz. Largh. Max.: **basale**
 aspetto: **ondulato**
 ampiezza angolo apicale: **medio**
 ampiezza angolo basale: **stretto**
 margine: **crenato**
 glandole: **globose**



Fiore

tipo: **rosaceo**
 grandezza: **grande**
 forma petali: **rotondi**
 colore petali: **rosa pallido**
 area petali mm²: **223**
 altezza pistillo: **uguale ad antere**

Ramo

lunghezza internodi: **medi**
 colorazione: **prevalentemente rossa**
 distrib. gemme a fiore: **tratto apicale**





F3 P9 Nord




F3 P9 Nord

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *precoce*

epoca di maturazione: **+ 18**

produttività: *media*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Selezione F3 P9 Nord in rapporto alle selezioni in catalogo



Brix

F3 P9 Nord

Caratt. qualitative

pH: *3,2*

acid. tit.(g/l): *1,2*

Brix: *17,5*

rapporto E/A: *15*

sovraccalore: *32 %*

aroma: *medio*

sapore: *buono*

Ac.tit.

E/A

Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle selezioni presenti in catalogo

Frutto

grandezza: *piccolo*

larghezza cm.: *5,2*

spessore cm.: *5*

altezza cm.: *5,1*

apice: *incavato*

umbone: *assente*

forma longitud.: *oblunga*

forma trasvers.: *triangolare solcata*

colore polpa: *bianco-venata*

aderenza nocciolo: *aderente*



Nocciolo

dimensione: *medio*

altezza cm.: *3,4*

larghezza cm.: *2,5*

spessore cm.: *2*

colore: *rosso*

forma: *ellittica*

superficie: *con cavità e scanalature*

angolo apicale: *medio*

simmetria: *simmetrico*



Foglia

ampiezza lembo cm²: 28,7
 lunghezza mm: 128
 larghezza mm: 33
 rapp. lung./larg.: 3.9
 posiz. Largh. Max.: basale
 aspetto: ondulato
 ampiezza angolo apicale: medio
 ampiezza angolo basale: stretto
 margine: crenato
 glandole: assenti



Fiore

tipo: rosaceo
 grandezza: grande
 forma petali: rotondi
 colore petali: rosa pallido
 area petali mm²: 235
 altezza pistillo: uguale ad antere

Ramo

lunghezza internodi: medi
 colorazione: prevalentemente rossa
 distrib. gemme a fiore: tratto apicale



Selezioni avanzate di pesco
a polpa gialla



F1 P19 Venezia Nord




F1 P19 Venezia Nord

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *media*

epoca di maturazione: **+ 46**

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Selezione F1 P19 Venezia Nord in rapporto alle selezioni in catalogo



F1 P19 Venezia Nord

Caratt. qualitative

pH: 3,5

acid. tit.(g/l): 1,03

Brix: 17

rapporto E/A: 16,7

sovraccogliere: 63 %

aroma: lieve

sapore: medio

Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle selezioni presenti in catalogo

Frutto

grandezza: piccolo

larghezza cm.: 5,3

spessore cm.: 5,1

altezza cm.: 5,3

apice: incavato

umbone: assente

forma longitud.: oblunga

forma trasvers.: triangolare solcata

colore polpa: gialla

aderenza nocciolo: aderente



Nocciolo

dimensione: medio

altezza cm.: 3,7

larghezza cm.: 2,6

spessore cm.: 1,9

colore: marrone chiaro

forma: ellittica

superficie: con cavità e scanalature

angolo apicale: medio

simmetria: asimmetrico



Foglia

ampiezza lembo cm²: 44,3
lunghezza mm: 149
larghezza mm: 44
rapp. lung./larg.: 3.7
posiz. Largh. Max.: *centrale*
aspetto: *increspato lungo la nervatura*
ampiezza angolo apicale: *medio*
ampiezza angolo basale: *medio*
margine: *crenato*
glandole: *reniformi*



Ramo

lunghezza internodi: *corti*
colorazione: *prevalentemente rossa*
distrib. gemme a fiore: *tratto mediano*



Fiore

tipo: *campanulaceo*
grandezza: *medio*
forma petali: *rotondi*
colore petali: *rosa intenso*
area petali mm²: 55
altezza pistillo: *uguale ad antere*





F4 P1 Venezia Nord




F4 P1 Venezia Nord

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *precoce*

epoca di maturazione: *+ 11*

produttività: *media*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Selezione F4 P1 Venezia Nord in rapporto alle selezioni in catalogo



F4 P1 Venezia Nord

Caratt. qualitative

pH: **3,6**
 acid. tit.(g/l): **1,0**
 Brix: **15,7**
 rapporto E/A: **15,5**
 sovraccalore: **62 %**
 aroma: **lieve**
 sapore: **discreto**

Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
 in rapporto alle selezioni presenti in catalogo

Frutto

grandezza: **piccolo**
 larghezza cm.: **5,3**
 spessore cm.: **5**
 altezza cm.: **5,6**
 apice: **incavato**
 umbone: **assente**
 forma longitud.: **oblunga**
 forma trasvers.: **a sutura depressa**
 colore polpa: **gialla**
 aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **medio**
 altezza cm.: **3,5**
 larghezza cm.: **2,3**
 spessore cm.: **1,6**
 colore: **marrone**
 forma: **ellittica**
 superficie: **con cavità e scanalature**
 angolo apicale: **ampio**
 simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 32,2
 lunghezza mm: 132
 larghezza mm: 36
 rapp. lung./larg.: 3.7
 posiz. Largh. Max.: basale
 aspetto: ondulato
 ampiezza angolo apicale: medio
 ampiezza angolo basale: stretto
 margine: crenato
 glandole: reniformi



Ramo

lunghezza internodi: medi
 colorazione: prevalentemente rossa
 distrib. gemme a fiore: tratto mediano



Fiore

tipo: rosaceo
 grandezza: grande
 forma petali: rotondi
 colore petali: rosa molto pallido
 area petali mm²: 225
 altezza pistillo: superiore ad antere





F1 P39 Venezia Sud




F1 P39 Venezia Sud

Caratteri agronomici

epoca di fioritura: *tardiva*


epoca di maturazione: *- 13*

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Selezione F1 P39 Venezia Sud in rapporto alle selezioni in catalogo

F1 P39 Venezia Sud



Caratt. qualitative

pH: **3,6**

acid. tit.(g/l): **0,97**

Brix: **11,4**

rapporto E/A: **11,7**

sovraccalore: **90 %**

aroma: **intenso**

sapore: **buono**

Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle selezioni presenti in catalogo

Frutto

grandezza: **piccolo**

larghezza cm.: **5,4**

spessore cm.: **5,2**

altezza cm.: **5,4**

apice: **arrotondato**

umbone: **assente**

forma longitud.: **rotonda**

forma trasvers.: **rotonda**

colore polpa: **giallo-venata**

aderenza nocciolo: **aderente**



Nocciolo

dimensione: **medio**

altezza cm.: **2,7**

larghezza cm.: **2,1**

spessore cm.: **1,6**

colore: **marrone chiaro**

forma: **obovata**

superficie: **con scanalature**

angolo apicale: **medio**

simmetria: **asimmetrico**



Foglia

ampiezza lembo cm²: 40,5
 lunghezza mm: 143
 larghezza mm: 40
 rapp. lung./larg.: 3.6
 posiz. Largh. Max.: centrale
 aspetto: ondulato
 ampiezza angolo apicale: medio
 ampiezza angolo basale: medio
 margine: crenato
 glandole: globose



Ramo

lunghezza internodi: corti
 colorazione: prevalentemente rossa
 distrib. gemme a fiore: tratto mediano



Fiore

tipo: rosaceo
 grandezza: grande
 forma petali: ellittico-allungata
 colore petali: rosa molto pallido
 area petali mm²: 200
 altezza pistillo: uguale ad antere





F7 P19 Chiana




F7 P19 Chiana

Caratteri agronomici


epoca di fioritura: *precoce*

epoca di maturazione: **+ 53**

produttività: *bassa*



Fenologia della fioritura e della maturazione della Selezione F7 P19 Chiana in rapporto alle selezioni in catalogo



F7P19 Chiana

Caratt. qualitative

pH: 3,6

acid. tit.(g/l): 1,1

Brix: 16,8

rapporto E/A: 15,3

sovraccolore: 47 %

aroma: presente

sapore: buono

Quadro sinottico delle caratteristiche qualitative
in rapporto alle selezioni presenti in catalogo

Frutto

grandezza: piccolo

larghezza cm.: 5,2

spessore cm.: 5,2

altezza cm.: 5,4

apice: sporgente

umbone: presente

forma longitud.: oblunga

forma trasvers.: rotonda

colore polpa: gialla

aderenza nocciolo: aderente



Nocciolo

dimensione: grande

altezza cm.: 3,8

larghezza cm.: 3,1

spessore cm.: 2,1

colore: marrone

forma: obovata

superficie: con cavità e scanalature

angolo apicale: medio

simmetria: asimmetrico



Foglia

ampiezza lembo cm²: 44,4
 lunghezza mm: 139
 larghezza mm: 45
 rapp. lung./larg.: 3.1
 posiz. Largh. Max.: *centrale*
 aspetto: *ondulato*
 ampiezza angolo apicale: *ampio*
 ampiezza angolo basale: *medio*
 margine: *crenato*
 glandole: *reniformi*



Fiore

tipo: *campanulaceo*
 grandezza: *medio*
 forma petali: *rotondi*
 colore petali: *rosa*
 area petali mm²: 30
 altezza pistillo: *uguale ad antere*

Ramo

lunghezza internodi: *corti*
 colorazione: *prevalentemente rossa*
 distrib. gemme a fiore: *tratto apicale*

